

Beste Reifebedingungen

Die Entwicklung der Witterung bestimmt den weiteren Verlauf

Der Gesundheitszustand der Trauben ist im Gebiet Pfalz als zufriedenstellend zu bewerten. Die °Oechsle Zunahme in der letzten Woche lag stellenweise zwischen 10-15°Oe. Die Rebsorten Silvaner, Grauburgunder, Weißburgunder sowie der Spätburgunder zeigen in der letzten Woche den größten Reifesprung auf. Hingegen zeigen die Rebsorten Riesling, Portugieser und Dornfelder zurzeit Werte die im langjährigen Durchschnitt liegen. Im Gebiet der Pfalz wurde für den Riesling 53°Oechsle und 20 g/l als Säurewert bestimmt. Diese Entwicklung ist auch im Gebiet Rheingau zu erkennen. Im Gebiet Rheingau konnten Durchschnittswerte bei der Rebsorte Riesling mit 49,5°Oechsle und 24,4 g/l Säure am 24.8.2009 gemessen werden. Der Spätburgunder ist bereits bei einem Zuckergehalt von 67,5°Oechsle und 16,7 g/l Säure angekommen und die Rebanlagen von Müller-Thurgau weisen einen Durchschnittswert von 68,7 °Oechsle und 9,4 g/l Säure auf.

In den nachfolgenden Tabellen sind die jeweiligen Reifedaten vom 24.08.2009 im Vergleich zu den letztjährigen Reifedaten dargestellt.

Nahe	Oechsle [°]		Veränderung 25.08.2008 - 24.08.2009	Säure [g/l]		Veränderung 25.08.2008 - 24.08.2009
Rebsorte	25.08.2008	24.08.2009	Anstieg (°Oe)	25.08.2008	24.08.2009	Abfall (g/l)
Müller-Thurgau	55	60,1	5,1	14,5	12,9	-1,6
Riesling	46,9	43,2	-3,7	27,2	25,2	-2
Dornfelder	51,1	54,4	3,3	15,3	13,1	-2,2
Spätburgunder	53,6	57,7	4,1	23,1	22,8	-0,3

Rheinessen	Oechsle [°]	Oechsle [°]	Veränderung 25.08.2008 - 24.08.2009	Säure [g/l]	Säure [g/l]	Veränderung 25.08.2008 - 24.08.2009
Rebsorte	25.08.2008	24.08.2009	Anstieg (°Oe)	25.08.2008	24.08.2009	Abfall (g/l)
Grauburgunder	57,6	67,4	9,8	18,7	15,4	-3,3
Müller-Thurgau	57,8	66,9	9,1	12,2	10,2	-2
Riesling	50,5	49,9	-0,6	24,2	22,7	-1,5
Silvaner	52,9	56,5	3,6	18,4	15,7	-2,7
Weißburgunder	54,8	63,7	8,9	21,1	17,7	-3,4
Dornfelder	52,7	59,3	6,6	12,1	10	-2,1
Portugieser	50,7	51,8	1,1	12,8	10,9	-1,9
Regent	67,1	77,2	10,1	9,9	9,1	-0,8
Spätburgunder	57,3	67,5	10,2	20,8	17	-3,8

Pfalz	Oechsle [°]	Oechsle [°]	Veränderung 25.08.2008 - 24.08.2009	Säure [g/l]	Säure [g/l]	Veränderung 25.08.2008 - 24.08.2009
Rebsorte	25.08.2008	24.08.2009	Anstieg (°Oe)	25.08.2008	24.08.2009	Abfall (g/l)
Grauburgunder	59,1	68,6	9,5	19,1	14,1	-5
Müller-Thurgau	58,5	66,5	8	12,8	10,6	-2,2
Riesling	51	53,2	2,2	24,9	20,7	-4,2
Silvaner	53,3	55,4	2,1	19,1	15,1	-4
Weißburgunder	57,2	66,9	9,7	20,4	15,5	-4,9
Dornfelder	55,5	54,9	-0,6	12	10,4	-1,6
Portugieser	54,5	53,9	-0,6	13,7	11,7	-2
Regent	68,2	72,8	4,6	11	9,8	-1,2
Spätburgunder	58,3	66,5	8,2	23,8	18,1	-5,7
Sauvignon blanc						

Rheingau	Oechsle [°]	Oechsle [°]	Veränderung 25.08.2008 - 24.08.2009	Säure [g/l]	Säure [g/l]	Veränderung 25.08.2008 - 24.08.2009
Rebsorte	25.08.2008	24.08.2009	Anstieg (°Oe)	25.08.2008	24.08.2009	Abfall (g/l)
Riesling						
Lorch (Schlossberg)	51	54	3	28,5	19,6	-8,9
Lorch (Kapellenberg)	47	46	-1	32,1	22,3	-9,8
Rüdesheim (Berg Schlossberg)	63	57	-6	19,1	15,8	-3,3
Rüdesheim (Bischofsberg)	46	55	9	30,3	21,1	-9,2
Geisenheim (Mäuerchen)	52	60	8	26,8	19,6	-7,2
Geisenheim (Kläuserweg)	55	50	-5	22,4	20	-2,4
Winkel (Hasensprung)	45	50	5	30,2	27,9	-2,3
Winkel (Gutenberg)	43	49	6	29,6	26,3	-3,3
Oestrich (Lenchen)	45	40	-5	31,2	31,7	0,5
Oestrich (Doosberg)	49	51	2	27,8	23,3	-4,5
Hattenheim (Engelmannsberg)	52	50	-2	26,7	24	-2,7
Hattenheim (Schützenhaus)	44	42	-2	30,1	31,9	1,8
Erbach (Marcobrunn)	52	61	9	26,2	21	-5,2
Eltville (Langenstück)	49	55	6	28,7	25,2	-3,5
Eltville (Sonnenberg)	45	56	11	30,2	24,8	-5,4
Kiedrich (Gärtenberg)	53	51	-2	23	23	0
Kiedrich (Sandgrub)	50	44	-6	24	27	3
Walluf (Walkenberg)	44	51	7	30,4	26,8	-3,6
Walluf (Oberberg)	48	48	0	24,6	27,2	2,6
Rauenthal (Baiken)	51	44	-7	27	26	-1
Rauenthal (Langenstück)	45	30	-15	31	33	2
Frauenstein (Herrnberg)	48	41	-7	29,7	31	1,3
Hochheim (Kirchenstück)	50	51	1	26	16,5	-9,5
Hochheim (Hölle)	48	51	3	24	18	-6
Spätburgunder			0			
Lorch (Schlossberg)	61	64	3	22,9	16,3	-6,6
Assmannshausen (Höllenberg)	51	78	27	27	14,7	-12,3
Geisenheim (Fuchsberg)	58	72	14	21,2	12,9	-8,3
Eltville (Sonnenberg)	57	62	5	24,7	19,6	-5,1
Frauenstein (Herrnberg)	50	60	10	28,3	21,8	-6,5
Hochheim (Stein)	57	69	12	18	15	-3
Müller-Thurgau						
Rüdesheim (Klosterberg)	58	68	10	12,7	9,9	-2,8
Eltville (Taubenbreg)	52	70	18	15,1	9,6	-5,5
Frauenstein (Herrnberg)	60	68	8	11,9	8,8	-3,1
Frühburgunder (Geisenheim)	84	89	5	8,8	7,5	-1,3
Weißburgunder (Hattenheim)	62	69	7	18,7	14,5	-4,2
Reichensteiner (Lorch)	66	71	5	12,4	9,7	-2,7
Dunkelfelder (Lorch)	63	68	5	13,1	11,9	-1,2
Rondo (Geisenheim)	74	79	5	10,4	9,7	-0,7

Aus den Tabellen ist ersichtlich, dass einige Rebsorten wie der Müller-Thurgau, Silvaner, Grauburgunder, Weißburgunder aber auch Spätburgunder eher auf dem Reifenniveau von 2007 liegen, hingegen der Riesling sowie Portugieser und Dornfelder geringere Reifevorsprünge aufweisen. Eine Aussage über den Säureverlauf ist besonders in diesem Jahr sehr problematisch, da extreme Schwankungen innerhalb der Anlagen festgestellt werden. Diese sind begründet in den unterschiedlichen Traubenbeerengrößen die auf die Verrieselung der Trauben während der Blüte zurückzuführen ist.

Ein weiterer Aspekt der besonders betrachtet werden muss, sind die regional stark auftretenden Peronosporaschäden an den Trauben. Der weitere Witterungsverlauf entscheidet, ob diese geschädigten Beeren weiterhin eintrocknen und eventuell abfallen, oder ob es zu weiteren Schädigungen der Traube kommt. Weiterhin sind auch häufig kleine Schäden an der oberen Laubwand anzutreffen, dies könnte abhängig von der Laubwand zu weiteren, veränderten Trauben - Reifeverläufen führen.

Im Allgemeinen ist ein insgesamt guter Gesundheitszustand in den Weinbergen mit nur geringem Infektionsdruck erkennbar.